

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-3-67 623556

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, ~~NIÈVRE~~, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS

C. C. P. : ORLÉANS 4.604.25

ABONNEMENT ANNUEL

25 Francs

Supplément n°3 au Bulletin n° 78

13 MARS 1967

- 6 -

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à la maturation des périthèces. Les projections d'ascospores sont de plus en plus nombreuses et risquent de devenir rapidement très importantes.

Les pluies orageuses parfois très abondantes ont, dans certains cas, lessivé le traitement conseillé dans nos Bulletins des 3 et 8 Mars.

En conséquence, il y a lieu de renouveler le traitement dans tous les cas où celui-ci aura été lessivé par les pluies de ces derniers jours. Dans les situations les plus froides où ce traitement n'a pas encore été effectué il y a lieu de l'appliquer dès que les variétés seront arrivées aux stades sensibles C3-D.

TAVELURE DU POMMIER

Comme pour la Tavelure du poirier les conditions climatiques favorisent la maturation des périthèces. Les projections d'ascospores deviennent de plus en plus nombreuses.

En conséquence, dans le nord du département de l'Indre-et-Loire et les régions de l'Eure-et-Loir, où aucun traitement n'a encore été effectué, il y a lieu de faire une première application sur toutes les variétés précoces ayant atteint ou dépassé les stades C3-D.

Dans les autres régions il y a lieu de renouveler le traitement qui a été effectué conformément aux indications données dans le Bulletin du 8 Mars, dans tous les cas où il a été lessivé par les pluies de ces derniers jours.

Nous rappelons que pour les variétés plus tardives ce traitement devra être appliqué dès que la majorité des boutons floraux aura atteint les stades C3-D, sans attendre un nouvel avis de la Station.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

OIDIUM DU POMMIER

Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin du 8 Mars.

Il est conseillé d'effectuer un premier traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le Stade C, dans tous les vergers où les manifestations de la maladie étaient nombreuses l'année dernière.

.../...

PERITELE GRIS

Les premiers adultes ont été observés. Dans les vergers où l'on craint les attaques de ce ravageur il convient d'être très attentif afin d'intervenir dès l'observation des premiers dégâts.

Les Péritèles sont très difficiles à détruire. Seuls les poudrages copieux sur les arbres avec des produits à base de D.D.T., de LINDANE ou d'ALDRINE donnent des résultats.

MONILIA DU CERISIER

Dans les expositions les plus précoces les variétés les plus hâtives vont arriver au stade D, stade à partir duquel elles deviennent très sensibles au Monilia. Il est donc conseillé d'effectuer un traitement dès que la majorité des bourgeons à fleurs aura atteint les stades D-E en utilisant un produit à base de cuivre à la dose voulue pour avoir 250 g de cuivre par hectolitre de bouillie.

MONILIA DU PRUNIER

Les fleurs de prunier peuvent être également détruites par le Monilia.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement sur tous les pruniers dont la majorité des bourgeons à fleurs est arrivée ou a dépassé le stade où les fleurs commencent à se dégager dans l'inflorescence.

On peut utiliser soit un produit à base de cuivre à la dose voulue pour avoir 250 g de cuivre par hectolitre de bouillie, soit un fongicide organique de synthèse. Les produits cupriques sont à éviter pendant la pleine floraison.

CLOQUE DU PRUNIER OU MALADIE DES POCHETTES

Cette maladie que l'on rencontre dans certains vergers de pruniers provoque la déformation des fruits qui s'allongent anormalement, restent creux, aplatis et sans noyaux. Le champignon responsable de cette maladie pénètre dans la fleur avant la floraison.

Le traitement dirigé contre le Monilia est également efficace contre la Maladie des Pochettes.

CECIDOMYIE DES POIRETTES

Dans les quelques vergers où ce ravageur fait des dégâts (jeunes poires en forme de calebasses renfermant des asticots) il est conseillé d'effectuer un traitement quand la majorité des boutons floraux est arrivée au stade D).

On peut utiliser soit un produit à base de D.D.T. (100 g de matière active par hectolitre), soit un produit à base d'H.C.H. (100 g de matière active par hectolitre), soit un produit à base de LINDANE (12 g de matière active par hectolitre).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,
G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
G. BENAS.